

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY PACJENTA NA ZABIEG OPERACYJNY ŻYŁAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH METODĄ KLASYCZNĄ

Nazwisko i imię Pacjenta:

PESEL/ data urodzenia:

Nr historii choroby:

Osoba upoważniona do wyrażenia zgody:

Opis proponowanego zabiegu operacyjnego:

Celem proponowanego Panu/i zabiegu jest likwidacja źródeł patologicznego przecieku krwi z układu żył głębokich do układu żył powierzchownych kończyn dolnych, a w konsekwencji ograniczenie ryzyka rozwoju/ nawrotu zakrzepicy żył głębokich, zatoru płuc, zakrzepowego zapalenia żył, owrzodzenia żylnego, zmniejszenie dolegliwości takich jak: obrzęki, kurcze mięśni, ciężkość i zmęczenie nóg, a także poprawa wyglądu kończyn.

Leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną obejmuje stripping żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej i miniflebectomi. Zabieg polega na nacięciu skóry w pachwinie, na udzie i goleni, a następnie usunięciu, lub podwiązaniu niewydolnych żył i żylaków oraz podwiązaniu niewydolnych perforatorów.

Przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i sedacji anestetycznej. Przy prawidłowym przebiegu pooperacyjnym czas hospitalizacji w klinice wynosi od kilku do 24 godzin. Po operacji konieczna jest stała profilaktyka przeciwżylakowa i utrzymanie uciskowego opatrunku na operowanej kończynie do czasu wizyty kontrolnej.

Możliwe powikłania związane z proponowanym zabiegiem operacyjnym:

Żaden zabieg operacyjny nie jest całkowicie wolny od ryzyka. Ciężkie, zagrażające życiu lub śmiertelne powikłania zdarzają się rzadko, jednak nigdy nie można ich wykluczyć. Do możliwych powikłań związanych z proponowanym Panu/i zabiegiem operacyjnym należą:

- Krwiaki
- Przerośnięta blizna lub bliznowiec
- Zaburzenia czucia w okolicy rany pooperacyjnej
- Wyciek chłonki z rany pooperacyjnej
- Zakażenie rany pooperacyjnej
- Martwica skóry
- Zaburzenia rytmu serca
- Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych
- Niepożądane działania leków- wysypka, uczulenie, reakcja anafilaktyczna, wstrząs
- Zakrzepica żył głębokich
- Zator tętnicy płucnej

- Niewydolność krążeniowo-oddechowa, zawał mięśnia sercowego
- Objawy ze strony centralnego układu nerwowego
- Inne rzadkie, trudne do przewidzenia powikłania, ze zgonem włącznie

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić, ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy zgłaszać się do lekarza prowadzącego.

W czasie zabiegu można stwierdzić istnienie szczególnych i trudnych do przewidzenia okoliczności, które mogą wymagać zmiany lub rozszerzenia wstępnie proponowanego zabiegu.

Wydanie z dnia: