

INFORMACJA DLA PACJENTA

Postępowanie po zabiegach klasycznych

- Pierwsza zmiana opatrunku w drugiej dobie po operacji.
- Pielęgnacja rany preparatem **SUTRISEPT** lub innym zaleconym przez lekarza.
- Przykrycie rany jałowym opatrunkiem.
- Kolejna zmiana opatrunku w następnej dobie - 1 x dziennie o stałej porze.
- Pończochę uciskową należy nosić **w dzień i noc przez 7 dni** po zabiegu. Zdejmować tylko do zmiany opatrunku.
- Następnie pończochę uciskową nosić **tylko w dzień przez 4 tygodnie** po zabiegu.
- Usunięcie szwów w 8-9 dobie po operacji.
- Leki zażyć w dniu zabiegu po powrocie do domu, po posiłku, wg zaleceń lekarza.
- Po wyjściu ze szpitala Pacjenci mogą i powinni normalnie funkcjonować. Utrzymywać dotychczasowy tryb życia jednak więcej niż dotychczas chodzić, spacerować itp.
- Skóra nad zamykaną żyłą i żyłakami, może być bolesna przy dotyku, zazwyczaj występują niewielkie siniaki i grudki, które wchłaniają się w ciągu kilku tygodni. Zastosowanie **ANAPRAN-u**, ibuprofenu lub innych leków przeciwbólowych w zupełności pozwala na opanowanie dolegliwości.
- **Przeciwwskazaniem** jest dźwiganie ciężarów powyżej 20 kg oraz przebywanie przez dłuższy czas ekstremalnie niskich i ekstremalnie wysokich temperaturach przez okres ok. 6 tygodni po zabiegu.
- Przez 24 godz. Po zabiegu nie wolno podejmować ważnych decyzji, prowadzić pojazdów mechanicznych ani spożywać alkoholu i innych używek.

.....
Podpis i pieczęć lekarza